

Ecografi per la Clinica Reumatologica dell'Ospedale di Udine

La Rotary Foundation ha autorizzato la concessione della sovvenzione globale n. 2015990 di USD 37.000,00, destinata a fornire alla Clinica Reumatologica dell'Ospedale di Udine due ecografi completi delle relative sonde destinati a una precoce individuazione dell'arterite a cellule giganti; patologia altamente invalidante che colpisce gli ultracinquantenni potendo portare anche alla completa cecità.

Il progetto vede come partner ospitante il Club Codroipo - Villa Manin e, come Internazionale il Club Capodistria, le funzioni di organismo cooperante sono state affidate alla Clinica Reumatologica dell'Ospedale di Udine.

Al finanziamento della sovvenzione hanno partecipato, oltre al nostro Distretto, e ai due Club promotori, anche i Club Aquileia - Cervignano - Palmanova, Cividale del Friuli, Lignano Sabbiadoro - Tagliamento, Udine ed Udine Patriarcato, che hanno, complessivamente, raccolto US\$ 13.000,00.

Quando il medico deve sospettare ACG

L'arterite a cellule giganti (ACG) è una vasculite caratterizzata da un'infiammazione granulomatosa distalmente dalle pareti dei grandi vasi.

Prevalenza annuale varia tra 6 e 32 nuovi casi su 100.000 abitanti. La malattia colpisce adulti di età superiore ai 50 anni; le donne sono colpite 3 volte più frequentemente degli uomini.

Il riconoscimento precoce e il trattamento tempestivo dell'ACG sono fondamentali per prevenire le complicanze più temute.

ATTENZIONE: CONTATTA SUBITO LO SPECIALISTA PER PREVENIRE GRAVI COMPLICANZE

La cecità è la complicanza più temuta e colpisce dall'8 al 20% dei pazienti. Aneurisma della aorta, infarto miocardico e ictus sono possibili complicanze meno frequenti. Diagnosi e trattamento tempestivi sono essenziali per prevenire gravi complicanze.

ACG PMR

ARTERITE A CELLULE GIGANTI POLIMIALGIA REUMATICA

LA POLIMIALGIA REUMATICA E L'ARTERITE A CELLULE GIGANTI SONO MALATTIE CHE POSSONO ESSERE CORRELATE.

- Il 50% dei pazienti con ACG può sviluppare Polimialgia Reumatica.
- Il 15% dei pazienti con Polimialgia Reumatica può sviluppare ACG.
- I pazienti con Polimialgia Reumatica trattati con benidolo e steroidi, se recidivano potrebbero essere con ACG.

Sintomi della PMR

- Ripetita mattutina o serale rigidità scapolare e/o poliviale > 45 minuti
- Indici di flogosi elevati
- Età superiore ai 50 anni
- Dolore, gonfiore e limitazione funzionale al dito di scapolare o poliviale

Area del dolore

Sei più colpito dalla esperienza reumatologica? Impostare il piano terapeutico più indicato sulla base delle opzioni di trattamento ora disponibili.

PREVENZIONE (benidolo) (5mg o 10mg fino alla visita del reumatologo)

Se il caso di disturbi viene avuto ricorrendo al pronto soccorso per valutazione reumatologica

Se il caso di TIA/ictus o infarto miocardico è avuto ricorrendo al pronto soccorso per valutazione reumatologica

Se il caso di ACG è avuto ricorrendo al pronto soccorso per valutazione reumatologica

Rotary Distretto 2060

